REVISTA

DE LA

Sociedad Entomológica Argentina

Vol. XI 31 de agosto de 1942 N.° 4

LEPIDOPTEROS POCO CONOCIDOS O NUEVOS PARA LA REPUBLICA ARGENTINA

por

PABLO KÖHLER

Por las colectas efectuadas en nuestros viajes y por la desinteresada colaboración de entomólogos y aficionados amigos, aumenta continuamente el número de especies de Lepidópteros. De la gran cantidad que tenemos para determinar, hemos escogido algunas especialmente interesantes que presentamos en este trabajo. Se trata, en general, de especies cuya existencia en nuestro país era desconocida o que muestran un rara distribución geográfica. Por esta razón citamos también aunque *in litt.*, una especie nueva de *Agrotinae*.

Amatidae (Syntomidae).

Aethria frigida Burm.

Descr. Phys. Rep. Arg. 5: 516.

Descripta por *Eurata* no ha sido hallada después de Burmeister. En la col. Breyer existen 2 ejemplares procedentes de Punta Lara, Buenos Aires, cazadas en marzo de 1941.

Eucereum quadricolor Wlkr.

List. Lep. Brit. Mus., 2: 443.

Desde México a Brasil variando algo en tamaño y coloración. La forma paraguaya —*meridionale* Rotsch—, no coincide con

las características del ejemplar que hemos cazado en Misiones: este es exactamente igual a la forma original, *mexicana*.

Hypocladia calita Dogn. (??)

Het. nouv. Am. Sud., 2: 9.

Una especie descripta de Colombia. Nuestro ejemplar, cazado en Rosas, (F. C. S.), Buenos Aires, por el colega Daguerre, coincide en general con la descripción, pero hay mucha probabilidad de que se trate de una especie nueva, dilema que podrá ser dilucidado, tan pronto se consiga más material. El ejemplar mencionado es hembra.

Arctiidae.

Pseudalus limonia Schs.

Journ. N. Y. Ent. Soc., 4: 135.

Descripto del Sur del Brasil. Un ejemplar cazado por Bourquin en Puerto Aguirre, Misiones, enero de 1934.

Pseudalus leos occidentalis Rothsch.

Novit. Zool., 16: 52.

De las Guayanas, Perú y Bolivia. Un ejemplar, cazado por Hayward en Puerto Bemberg. Misiones, demuestra la gran distribución geográfica de esta especie rara.

Elysius dryas ab. *erythrinovertex* Std.

Lepidopt. Catalog. 22: 49.

De la América Central hasta el Brasil. Nuestro ejemplar procede de Puerto Bemberg, Misiones, y ha sido cazado a la luz en el mes de septiembre.

Halisidota lineata rosetta Schs.

Journ. N. Y. Ent. Soc., 4: 139.

Especie conocida del Sur del Brasil y del Río Songo, Bolivia.

Nuestro ejemplar procede de Catamarca, Schaefer *leg.*, donde se han capturado últimamente muchas especies que originariamente viven en los altiplanos bolivianos.

Pericopinae.

Daritis centenaria Burm.

Descr. Phys. Rep. Arg., **5**: 436.

Une especie muy rara que se conoce en pocos ejemplares, procedentes de la provincia de Buenos Aires y de Montevideo, Uruguay. Hace poco recibimos otro ejemplar más de Las Breñas, Chaco, (Mallo *leg.*) que demuestra que también esta especie, a pesar de ser muy rara, tiene una gran área de dispersión.

Dioptidae.

Phaeochlana gyon lampra Prout.

Nov. Zool., **25**. 398.

La subespecie típica del Sur del Brasil, la cazamos en Misiones. También hay ejemplares cazados por Breyer en la misma zona de donde procede también la siguiente subespecie:

Phaeochlana gyon dorsistriga Std.

Arch. Naturgesch., 86 *A.* **7**: 135.

Ha sido descripta sobre ejemplares del Norte de Sudamérica.

Josia oribia Drc.

1885, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 528.

Originaria de Bolivia. Hemos cazado ejemplares típicos en Tartagal, Salta, zona ya muy cercana a los límites de Bolivia.

Lymantriidae.

Thagona tibialis Wlkr.

1885, *Cat. Het. Brit. Mus.*, **4**: 842.

Conocida desde México hasta el Sur del Brasil. Una especie rara que cazamos a la luz en Puerto Bemberg, Misiones.

Lasiocampidae.

Mesera arpia Schs.

1896, *Journ. Ent. Soc. N. Y.*, 4: 145.

Poseemos un ejemplar de Misiones (Bosq. *leg.*) y es el único que hemos visto, a pesar que la especie está descripta de la Argentina y del Sur del Brasil. Debe de ser bastante rara.

Macromphalia chilensis Fldr.

1874, *Reise Novara, Lep.*, 4:
1874, *Reise Novara, Lep.*, 4.

Conocida de Chile. Recibimos ejemplares de Nahuel Huapí; Neuquen y de Esquel, Chubut.

Macromphalia valdiviensis Dogn.

1912, *Mem. Soc. Ent. Belg.*, **19**: 157.

Oriunda de Chile; la recibimos, lo mismo que la anterior, de Esquel, Chubut, Pose *leg.*

Artace cribraria Ljung.

1825, *Vet, Acad. Handl.*, 348.

A pesar de ser descripta del Sur del Brasil, del Paraguay y de la Argentina, la cito por no ser especie común en Misiones, (Eldorado, Bosq. *leg*).

Euglyphis submarginalis Wlkr.

1866, *Cat. Lep. Brit. Mus.*, **35**: 1948.

México-Colombia-Brasil, común en todas las zonas. La tenemos en cantidad de Misiones: Iguazú, Breyer *leg.*, Puerto Bemberg, Köhler *leg.*, Eldorado Bosq *leg.*

Euglyphis plana Wlkr.

1855, *Cat. Lep. Brit. Mus.*, 6: 1402.

De Espíritu Santo, Brasil. Muy común en Misiones: Iguazú (Breyer, Köhler, *leg*) Eldorado, Bosq *leg.*

Euglyphis melancholica Btlr.
1878, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, pág. 82.

Difundida desde México hasta Brasil. Ejemplares del Iguazú, Breyer *leg.*, y de Eldorado, Bosq *leg.*, Misiones. Raro .

Euglyphis marna Schs.
1896, *Journ. N. Y. Ent. Soc.*, 4: 143.

No muy común en Misiones.

Euglyphis braganza Schs.
1892, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, pág. 320.

Descripta de Colombia, Ecuador y Brasil. Ejemplares de la colección Breyer del Iguazú, Misiones, Breyer y Köhler *leg.*

Euglyphis semifunebris Schs.
1915, *Trans. Am. Ent. Soc.*, 41. 7.

Del Brasil. Ejemplares de Misiones de varias localidades (Breyer, Bosq, Ogloblin y Köhler *leg*).

Euglyphis deusta H. S.
1854, *Aussereur. Schmett.*, 1: Fig. 91.

Común en el Brasil, rara en Misiones

Euglyphis obtusa H. S.
1856, *Aussereur. Schmett.*, 1: Fig. 471.

Una especie brasiliana, no muy común en Misiones. Bosq *leg.* en Eldorado.

Euglyphis larunda Drc.
1887, *Biol. Cent. Am. Het.*, 2: 433.

Puerto Bemberg, Hayward *leg.* Iguazú, Köhler *leg.*

Euglyphis rivulosa Möschl.
1877, *Verhandl. Z. b. Wien.*, 27: 675.

Conocida desde las Guayanas hasta Colombia. Ejemplares argentinos de Misiones, Puerto Bemberg, Köhler *leg.*

Euglyphis egra Schs.
1910, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 6: 567.

De Costa Rica hasta el Amazonas. Es la especie más común en todo el territorio de Misiones. Iguazú, Breyer *leg.*, Puerto Bemberg, Köhler *leg.*, Puerto Aguirre, Bourquin *leg.*, Eldorado, Bosq *leg.*, Santa Ana, Ogloblin *leg.*

Euglyphis torrida Schs.
1910, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 6: 565.

De Costa Rica hasta Brasil. Pocos ejemplares de Misiones: Iguazú, Breyer, Köhler *leg.* Puerto Bemberg, Hayward *leg.*

Euglyphis lacrimosa Schs.
1892, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, pág. 320.

Del Brasil. Tenemos ejemplares de Misiones: Loreto, Oglobin *leg.*, Puerto Bemberg, Köhler *leg.*

Euglyphis guttularis Wlkr.
1855, *Cat. Lep. Brit. Mus.*, 6: 1402.

México hasta Brasil. Un ejemplar de Corrientes, Köhler *leg.*

Euglyphis sommeri Drt.
1927, *en Seitz, Grosschmett.*, **6**. 590.

Recién descripto de São Paulo. Ejemplares, cazados por Breyer, Hayward y el autor en el Alto Paraná (Puerto Bemberg e Iguazú).

Euglyphis revincta Drdt.
1927, *en Seitz, Grosschmett.*, **6**: 591.

Descripta del Perú. Un ejemplar del Iguazú, Breyer *leg.*

Mimallonidae.

Aceclostria mus Vuill.
1893. *Bul. Soc. Ent. France:* 182.

Ya ha sido citada en nuestro país, de Tucumán. El ejemplar que tenemos a la vista procede de Misiones, Puerto Bemberg, Köhler *leg.*

Saturniidae.

Hylesia corevia Sch.

1900, *Journ. N. Y. Ent. Soc.*, 8: 227.

Especie brasileña. Cazamos una hembra en Puerto Bemberg, Misiones.

Ormiscodes cinnamonea Feisth.

1839. *Mag. Zool.*, lam. 20., Fig. 2.

Común en Chile. Conseguimos ejemplares por medio de cría procedentes de la zona de los lagos del Sur: Nahuel Huapí, Neuquen y Esquel, Chubut, del lago Futalauquén. La oruga es muy polífaga. (Pose, Havrylenko y Köhler *leg*).

Sphingidae.

Protoparce stuarti Rotsch.

1896, *Nov. Zool.*, 3: 22.

Conocida por rara de Bolivia. Un ejemplar argentino, procedente de Catamarca ha sido cazado por el doctor Schäfer.

Megalopygidae.

Xenarchus carmen Schs.

1892. *Proc. Zool. Soc. Lond.*, pág. 321.

Una macho del Iguazú, Breyer *leg*.

Cossidae.

Chilecomadia Moorei Silva Figueroa.

1915, *Bol. Mus. Nac. Chile*, 8: 53.

Común en Chile. Existe también en gran cantidad en la zona boscosa del Suroeste argentino: Neuquen, Nahuel Huapí, Havrylenko *leg.*, Esquel, Chubut, Pose *leg*.

Langsdorfia infans Dyar (?).
1937, *en Seitz, Grosschmett,* 6: 1284.

Encontrada en San Bernardino, Paraguay. Nuestro ejemplar procede de Catamarca, Dr. Schäfer *leg.*

Hepialidae.

Triodia remota Pf.
Iris., **18**: 276.

Descripta del Perú, Challabamba, 4000 metros. Nuestro ejemplar ha sido cazado en el territorio del Neuquen, San Martín de los Andes (4-II-1941, Bridarolli S. J. *leg*).

Es digno de mencionar la gran distancia de los dos habitat, pero tenemos en *Noctuidae* casos análogos como se ve en el siguiente caso:

Noctuidae, Agrotinae.

Agrotis cuculliformis Khlr. *i. l.*

Los cotipos proceden de Comodoro Rivadavia, Chubut. Wittmer trajo un ejemplar de Oruro, Bolivia, 3700 metros.